

SABIA QUE...


As características de tamanho da ninhada são pouco hereditárias, porém têm potencial de ser melhoradas, devido à alta variância genética encontrada na raça!

As características relacionadas com a longevidade, produção e eficiência ao longo da vida são bastante hereditárias e podem ser usadas para melhorar a produtividade da raça!

O número de leitões nascidos vivos é um dos parâmetros que deverá ser considerado no momento de selecionar porcas reprodutoras!

Existe um grande potencial genético que poderia ser melhor explorado, utilizando para isso registos cuidadosos!

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS



o **Bísaro**
em números

9,3 leitões nascidos
8,9 nascidos vivos
7,4 desmamados
2,6 ninhadas por porca

ICASBísaro



idade ao 1º parto **54 semanas**
intervalo entre partos **6 meses**
longevidade produtiva **2 anos**

RECOMENDAÇÕES DE

MANEIO REPRODUTIVO

PARA MAIORES GANHOS

PROCURE:

Agrupar animais por sexo e idade

Usar a inseminação artificial para renovação genética da exploração

Castrar os leitões machos até aos 7 dias de idade (em conformidade com regulamento europeu 2008/120/EC)

Em animais com mais de 7 dias de idade, contacte a ANCSUB para ver as alternativas

Desmamar os leitões aos 30/35 dias

Formar ninhadas uniformes através de adoções

EVITE:

Manter juntos à engorda animais de diferentes sexos e idades

Desmamar os leitões tardiamente. A perda de condição corporal da porca reprodutora pode comprometer a sua fertilidade

Cobrir as marrãs muito novas e/ou com baixa condição corporal, pois agrava as perdas em leitão

Lembre-se que...

A castração de fêmeas não é permitida - procure a ANCSUB para alternativas

Os registos reprodutivos cuidados são essenciais para um manejo eficiente