

## SABIA QUE...

A imunocastração é temporária ?

A imunocastração não é muito cara !

A imunocastração não é baseada na administração de hormonas !


A imunocastração não afeta o rendimento de carcaça !

Os animais imunocastrados têm peso vivo e peso de carcaça semelhante aos animais castrados cirurgicamente !

P R O T O C O L O S

I M U N O  
C A S T R A Ç Ã O

J O V E N S



o **Bísaro**  
em meses

4 puberdade

5 maturidade sexual

12 abate fumeiro

# ICASBísaro

PDR  
2020  
PROGRAMA DE  
DESENVOLVIMENTO  
RURAL 2014-2020

PORTUGAL  
2020

UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional



utad  
CORANE

BÍSARO®  
Aldeia de Gimonde  
— Desde 1935 —

# RECOMENDAÇÕES DE PROTOSCOLOS DE IMUNOCASTRAÇÃO

## PROTOSCOLO RECOMENDADO:

(Improvac®)

3 inoculações iniciais,  
preferencialmente às 13, 17 e 21  
semanas de idade.

2 inoculações perto do fim de vida.

O protocolo proposto pode ser  
ajustado de acordo com estudos  
futuros.

## A NÃO ESQUECER:

As duas primeiras inoculações têm  
de ter 4 semanas de intervalo entre  
si.

A última inoculação tem de ser  
feita, no mínimo, 4-5 semanas antes  
do abate.

### Lembre-se que...

A imunocastração apenas é eficaz  
depois da segunda administração.

Os animais devem ser  
acompanhados para determinar a  
eficácia da imunocastração.