

SABIA QUE...

A imunocastração é temporária ?

A imunocastração não é muito cara !

A imunocastração não é baseada na administração de hormonas !


A imunocastração diminui a função testicular !

Não existem diferenças nas características físicas de **qualidade da carne** de animais imunocastrados e inteiros !

P R O T O C O L O

I M U N O
C A S T R A Ç Ã O

M A C H O S
A D U L T O S



o **Bísaro**
em meses

12 abate fumeiro

+18 abate reprodutores

ICASBísaro

PDR 2020
PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014-2020

PORTUGAL
2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional



utad
CORANE


BÍSARO
Aldeia de Gimonde
— Desde 1935 —

RECOMENDAÇÕES DE PROTOSCOLOS DE IMUNOCASTRAÇÃO

PROTOSCOLO RECOMENDADO:

(Improvac®)

2 inoculações perto do fim de vida,
com 4 semanas de intervalo.

Possibilidade haver necessidade de
uma terceira inoculação no caso de
animais muito velhos, ou em que a
redução do tamanho testicular não
tenha sido muito notória.

A NÃO ESQUECER:

As inoculações têm de ter, no
mínimo, 4 semanas de intervalo
entre si.

A última inoculação tem de ser
feita, no mínimo, 4-5 semanas antes
do abate.

Lembre-se que...

A imunocastração apenas é eficaz
depois da segunda administração.

Os animais devem ser
acompanhados para determinar a
eficácia da imunocastração.